Souris domestique – Mus musculus f. domestica

Un flyer pour des refuges pour animaux du Mäuseasyl

Elevage

Cage

- Armoire volière
- Aquarium avec construction dessus
- Aquarium pas plus haut que large
- La grille jusqu'à 5 mm en parallèle ou 10 mm en quarré

Inventaire

- Maisons faites de bois, céramique,liège, terre cuite comportant des trous a.p.d. 5cm ∅
- Racines, branches, liège, cordes, noix de coco
- Roue de souris a.p.d. 28 cm ∅

Litière

- Litière de bois, chanvre ou lin peu poussiéreux
- Profondeur: 10-25 cm
- Sol peu poussiéreux
- Pas de litière à pellets
- Pas de litière pour chats

Emplacement

- Avec lumière de jour
- Sans courrants d'air
- A.p.d. 18°
- Si possible pas dans la même pièce que des oiseaux ou ennemis naturels

Alimentation

Graines

- Céréales
- Millet
- Semences de gazon
- Graines sauvages et de mauvaises herbes
- Graines grasses

Séché

- Herbes
- Fleurs
- Légumes secs
- (Fruits secs)

Fraîche

- Des légumes tous les jours
- 2-3x/semaines des fruits
- Herbes (culinaires)
- Herbes sauvages/gazon

Protéine

- Insectes vivants (p.ex. ver de la farine; des crickets, des cafards)
- Insectes séchés
- Oeuf (cuits)
- Si PAS d'autre choix: croquettes pour chats

Santé & Comportement

Reproduction

- Durée de la gestation: a.p.p. 21 jours
- No. de petits par portée: 8-15
- Allaitement: a.p.p. 18 j.
- Maturité sexuelle: a.p.d. 28 jours
- Pas de pause entre les gestations

Maladies

- Maladies respiratoires (bruits de souffle)
- Parasites (acariens,vers, poux, rarement des protozoaires)
- tumeurs
- maladies de peau

Comportement social

- Maintenir en groupe a.p.d. 4 souris
- Groupe de femelles, de mâles castrés ou mixtes
- NE PAS les garder seul

Contention

- Avec 2 mains
- Rouleau papier toilette ou petit boitier
- NE PAS soulever uniquement par la queue
- Mord rarement

IMPORTANT: Les mâles des souris domestiques doivent être castrés. Sinon tôt ou tard ils vont se blesser gravement ou même s'entretuer. Les mâles doivent être castré a.p.d. 25-30g à l'age entre 12 semaines et 12 mois. Une anesthésie par inhalation est préférable par rapport à une à la seringue.