

# El ratón espinoso del Sinaí - *Acomys dimidiatus*

## Alojamiento



### Recinto

- Acuario con tapa
- Pajarera (de forma de amario)
- Construcciones propias muy estructurables
- Terrarios de tablero OSB
- No espacio para cavar



### Inventario

- Casitas de madera, barro, corcho, cerámica, ... con agujeros a partir de 6 cm Ø
- Raíces, ramas, laberintos, cocos, ...
- Ruedas a partir de 30 cm Ø
- Ideal: lámpara de calentamiento



### Yacija

- Yacija de madera, cáñamo, lino, ...
- Profundidad de la yacija 2-5 cm
- Baño de arena no necesario
- Yacija sin gránulos
- No arena para gatos



### Lugar

- Con luz natural
- Sin corriente de aire
- A partir de 20 grados
- De ser posible sin pájaros o depredadores en la misma habitación

## Alimentación



### Semillas

- Muy pocos cereales
- Mijo
- Semillas de gramíneas
- Semillas de hierbas salvajes y malas hierbas
- Pocas semillas grasosas



### Alimentos secos

- Hierbas
- Flores
- Verduras secas
- No frutos secos



### Forraje fresco

- Verduras a diario
- Frutas 1 vez a la semana como máximo
- Hierbas (culinarias)
- Hierbas salvajes
- Pastos



### Proteína

- insectos vivos (p.e. gusanos de harina, grillos, cucarachas)
- insectos secos
- huevos cocidos
- en caso necesario alimento seco para gatos

## Salud & Comportamiento



### Reproducción

- período de embarazo: app. 34-39 días
- tamaño de la camada: 1-4
- período de amamantamiento: app. 6 días
- madurez sexual: a partir de 8 meses
- período sin camadas: ninguno



### Enfermedades

- Trastorno del comportamiento
- parásitos (ácaros, malófagos, gusanos, rara vez protozoos)
- obesidad
- diarrea



### Compartimiento social

- grupos a partir de 4 ratones
- grupos de hembras, castrados y grupos mixtos
- grupos solamente de machos difícil
- NO alojamiento individual!



### Manejo

- Con ambas manos
- Con tubo de papel higiénico o una caja pequeña
- NO levante o agarre de la cola!
- Rara vez mordedor, pellizcan

**Importante:** Es posible alojar solamente ratones espinosos del Sinaí masculinos en un grupo. Podría ser necesario castrar individuos agresivos. Una alimentación incorrecta o defectos en cuanto al alojamiento pueden provocar el comer de colas y orejas en ambos sexos. El manejo de la cola puede resultar en su pérdida!!!